

GEBRAUCHSINFORMATION

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch und heben Sie sie auf.

Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Ihr Therapeut, Arzt oder Apotheker hilft Ihnen gerne weiter, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Rheucastin®

1. Was ist Rheucastin® und wofür wird es angewendet?

Rheucastin® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehört: Rheumatismus.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Rheucastin® beachten?

Rheucastin® darf nicht angewendet werden

- bei Überempfindlichkeit gegen Salicylate, Colchicin oder Korbblütler,
 - bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,
 - während der Schwangerschaft und in der Stillzeit.
- Während einer Therapie mit diesem Arzneimittel ist für sichere Empfängnisverhütung beider Geschlechter zu sorgen. Diese Empfängnisverhütung sollte von Männern noch 3 Monate nach Beendigung der Behandlung mit Rheucastin® betrieben werden. Frauen sollten bis zur folgenden Periode sicher verhüten.

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Anwendung von Rheucastin® zusammen mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile und Arzneiträger von Rheucastin®:
Dieses Arzneimittel enthält 52 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist Rheucastin® einzunehmen?

Die folgenden Angaben gelten für Erwachsene, soweit das Arzneimittel nicht anders verordnet wurde:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 5 - 10 Tropfen, bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3 mal täglich je 5 - 10 Tropfen einnehmen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Rheucastin® aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach dem auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatum.

Nicht über 25 °C lagern.

6. Weitere Informationen:

ZUSAMMENSETZUNG:

10 g (= 10,8 ml) enthalten:

Wirkstoffe:

Berberis vulgaris Dil. D 4	2,5 g
Colchicum autumnale Dil. D 4	2,5 g
Gaultheria procumbens (HAB 34) Dil. D 3 [HAB, V. 4a, Urt. mit Ethanol 86 % (m/m)]	2,5 g
Pseudognaphalium obtusifolium e planta tota flor. rec. Dil. D 4 (HAB, V. 3a)	2,5 g

Bestandteile 1 - 4 über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.

1 g entspricht 32 Tropfen.

INHALT: 50 / 100 ml Mischung zum Einnehmen.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6250694.00.00

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
Homöopathisches Laboratorium
Alexander Pflüger GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 4
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Stand der Information: Juni 2018



Therapie mit Rheucastin®

Der aus dem altgriechischen stammende Begriff Rheuma (dt. Fluss, Strömung) beschreibt den oft wandernden und ziehenden Charakter der Schmerzen. Wegen der großen Symptomvielfalt und der unterschiedlichen Erscheinungsformen spricht man heute von Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Man versteht darunter alle schmerzhaften, entzündlichen und / oder degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates mit Muskeln, Sehnen, Bändern, dem Skelett und den besonders schmerzempfindlichen Knochen- und Gelenkinnenhäuten.

Die Erkrankungen haben verschiedene Ursachen: Verschleiß durch körperliche Schwerarbeit kann ebenso krankheitsauslösend sein wie erbliche Veranlagungen, bestimmte Infektionskrankheiten oder Fehlsteuerungen des Immunsystems.

Rheucastin® ist ein breitgefächertes homöopathisches Komplexmittel, dessen Wirkstoffe eine lange Tradition bei der Behandlung entzündlich-rheumatischer Gelenkerkrankungen und des Weichteilrheumatismus haben. Es trägt damit zur Linderung von Schmerzzuständen des Muskelgewebes, der Knochenhaut und der Gelenkinnenhäute bei. Zusätzlich sollten die bisherigen Lebensgewohnheiten in Bezug auf Ernährung, Gewicht und Bewegung kritisch überprüft und ggf. entsprechende Änderungen vorgenommen werden, da dies häufig die Besserung der Beschwerden unterstützt.